

# بيلتيرول

**Bacillus thuringiensis**

مبيد حيوي بكتيري لمكافحة الديدان في  
الخضروات والمحاصيل والأعلاف



## المادة الفعالة :-

\* باسيلس ثيورينجينسس ( في ايه آر ، سلالة كورستاكي بيه بي - 54 ) 32% ( 32 )  
× 10<sup>6</sup> وحدة دولية/جم ( وزن/وزن )

\* Bacillus thuringiensis (var. Kurstaki strain PB-54) 32% (32x10<sup>6</sup> IU/g) (w/

## الوصف :-

مبيد حيوي بكتيري على هيئة مسحوق قابل للبلل لمكافحة الديدان في  
الخضروات والمحاصيل والأعلاف .

## صور الاصابات علي المحاصيل المختلفة



ديدان الاوراق



دودة الاوراق الخضراء



ثاقبات الذرة



دودة درنات البطاطا



دودة ثمار التفاح



دودة الملفوف



توتا ايسلوتا بالطماطم




دودة الفراشة ذات الظهر الماسي



دودة البنجر



## طريقة تأثير بكتيريا الباسيلس على الديدان :-



## توصيات التطبيق :-

- يتم رش المحصول والديدان في أطوارها الأولى ( من الطور اليرقي الأول وحتى الطور اليرقي الثالث ) ويفضل الرش في حالة ملاحظة الفراشات تطير بنشاط في الحقل .
- غير قابل للخلط مع المنتجات الأخرى. لا تخلط مع تركيبات غير موصى بها قد تؤثر على قابلية الحياة والنمو للجراثيم .
- عدم الرش أثناء ارتفاع درجات الحرارة أو هبوب الريح أو أثناء توقع هطول الأمطار .

## طريقة الاستخدام والجرعات :-

المحصول	الأفات المستهدفة	معدل الاستخدام	فترة التحريم	ملاحظات
الخضروات ( الطماطم، الملفوف، الزهرة، القرعيات، السبانخ، الخس والقليل )	دودة الثمار، دودة لفافة اوراق الملفوف، دودة الفراشة ذات الظهر الماسي، توتا ايسلوتا	0.5 - 1 كجم / هكتار في حجم 500 - 1000 لتر / هكتار	يوم واحد	يمكن إجراء التطبيقات طوال المرحلة الخضرية ، مع 3 معالجات على الأكثر، وفاصل 7 - 14 يوماً بين الرش
المحاصيل والاعلاف ( الذرة الصفراء، البرسيم )	ثاقبات كوز الذرة، ديدان الأوراق	0.5 - 1 كجم / هكتار في حجم 800 - 1500 لتر / هكتار		يمكن إجراء التطبيقات طوال المرحلة الخضرية ، مع 3 معالجات على الأكثر، وفاصل 7 - 14 يوماً بين الرش
أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية، التفاح، الزيتون	الديدان بأنواعها	0.5 - 1 كجم / هكتار في حجم 800 - 1500 لتر / هكتار		يمكن إجراء التطبيقات طوال المرحلة الخضرية ، مع 3 معالجات على الأكثر، وفاصل 7 - 14 يوماً بين الرش

## العبوات :

بيلثيرول متاح في عبوات وزن 1 كجم